



Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Schweizerischer Impfplan - Basisimpfungen*



Alter	Impfungen	Bemerkungen
2/4/6 Monate	Diphtherie/Starrkrampf/Keuchhusten (Diphtherie/Tetanus/Pertussis) Kinderlähmung (Poliomyelitis) Haemophilus influenzae Typ b	dreimalige Impfung im Abstand von 2 Monaten
12 Monate	Masern/Mumps/Röteln	alle
15 bis 24 Monate	Diphtherie/Starrkrampf/Keuchhusten Kinderlähmung Haemophilus influenzae Typ b	Auffrischimpfungen
	Masern/Mumps/Röteln	2. Dosis
4 bis 7 Jahre	Diphtherie/Starrkrampf/Keuchhusten Kinderlähmung	Auffrischimpfungen
	Masern/Mumps/Röteln	Nachholimpfung für Nichtgeimpfte
11 bis 15 Jahre	Diphtherie/Starrkrampf	Auffrischimpfungen
	Masern/Mumps/Röteln Kinderlähmung, Keuchhusten	Nachholimpfungen für Nichtgeimpfte
	Hepatitis B (Gelbsucht)	2-3 Dosen, je nach Impfstoff
	Varizellen (Windpocken)	Impfung nur falls Krankheit nie durchgemacht
	Gebärmutterhalskrebs (HPV)	nur für weibliche Jugendliche, 3 Dosen
15 bis 26 Jahre	Gebärmutterhalskrebs (HPV)	Nachholimpfungen für nichtgeimpfte Frauen
Erwachsene	Diphtherie/Starrkrampf	Auffrischimpfung alle 10 Jahre, bei Verletzungen schon nach 5 Jahren
	Kinderlähmung	nur bei Reisen in Endemiegebiete Auffrischimpfung alle 10 Jahre
	Masern/Mumps/Röteln	Nachholimpfung für Nichtgeimpfte
	Hepatitis B (Gelbsucht)	Risikogruppen, Reisende

*Stand Januar 2011: Empfohlen von der Eidgenössischen Kommission für Impffragen, dem Bundesamt für Gesundheit, den Schweizerischen Gesellschaften für Pädiatrie, Allgemeinmedizin und Prävention und Gesundheitswesen. Für individuelle ergänzende oder spezielle Impfungen wie z.B. Pneumokokken-, Meningokokken-, FSME (Zecken)-, Grippeimpfung u.a. nehmen Sie bitte mit Ihrer/ Ihrem Kinderärztin/ Kinderarzt oder Hausärztin/ Hausarzt Kontakt auf.